


گردنے کے دو ہو جانے کا راست۔ جب تک آپ کا حکم ”بہرے آئے ہوئے گردے“ کو شاخت نہیں کر لیتا وہ اسے قبول یا رد کرنے کی کوشش کرتا ہے گا تو اتنیہ دواؤں کے ذریعے مراحتی عمل کو ختم کر دیا جائے۔

سالہ سال کے تجربے، ریاضی اور دواؤں کی ترقی نے کذنی ٹرانسپلانتیشن کے بعد ہونے والے اس مراحتی عمل پر بعض پیچیدگیوں کے بعدقاً بول پالیا ہے۔



## کذنی ٹرانسپلانتیشن سے متعلق اپنے ڈاکٹر سے سوال کریں؟

مجھے گردنے کیلئے کون موزوں ترین رہے گا؟ (اہل خانہ، شریک حیات اور دوستوں میں سے)

گردنے کی طبیعہ کرنے والے کا جذبہ ہمت کس حد تک اہم ہے؟ سرجری کا علی کیا ہوتا ہے؟

سرجری کتنا وقت لے لی؟ آپ کن دواؤں سے علاج کرتے تھے؟

امیونو سرکر پر یہ دواؤں کے کیا سایہ ایفا کر رکھی ہوتے ہیں؟ ٹرانسپلانت کے کتنے عرصے بعد تک ادویات استعمال کرنا ہوں گی؟

سرجری کے بعد کیا تو قرکی جانی چاہئے؟

مشورے کیلئے کام کریں

021 - 35661000 ext 255 & 355

کذنی ٹرانسپلانتیشن کا آپریشن بے ہوش کے ماہر ڈاکٹر کی گرفتاری میں ہوتا ہے اور اس سرجری میں عمادوں سے تین گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ اگر سب بالکل ٹھیک ہیک ہوا ہو تو آپ اسی روز کھانے پینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

## میرے متاثر گردوں کا کیا ہوتا ہے؟

زیادہ تر کیسز میں متاثر گردوں کو کالا نہیں جاتا۔ تین ایسی وجود ہات ہیں جن کے باعث متاثر گردنے کا کمال دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

- دوبارہ افیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کوکال دیا جاتا ہے۔

- آپ کے گردنے اگر بہت زیادہ ہاں بلڈ پر شکار بہبہ ہوں۔

- پیشاب اگر پلٹ کر آپ کے گردوں میں آ جاتا ہو۔ (اسے ری۔ فلکس کہا جاتا ہے)

## ٹرانسپلانت کے بعد

آپریشن کے بعد آپ کو ضروری اور اہم مدد اشت میں رکھا جاتا ہے۔ بسا اوقات گردنے کا طلاق، سکت اور توقاتی کو بڑھاتی ہے۔

ٹرانسپلانت کے بعد آپ مزید بہتری کے ساتھ اپنے روزمرہ معمولات کی طرف لوٹتے ہیں اور (زنگی) کو خشگواریت سے جیتے گئے ہیں۔ آپ زیادہ کٹھوں کے ساتھ اپنے روزمرہ معمولات کو ناجم دینے لگتے ہیں۔

اگر آپ ٹرانسپلانت سے قبل ڈائیٹریٹھیڈول کے پابند نہیں ہیں۔ اس وقت کھکھ کر آپ کو زیادہ آزادی ہے کیونکہ آپ ڈائیٹریٹھیڈول کے پابند نہیں ہیں۔

گردنہ ناکارہ ہو جانے کے بعد خون کی کوہ جانا ایک عمومی مشکل ہے، جسے ٹرانسپلانت کے بعد سدھا را جسٹا ہے۔ اگر آپ ہالی بلڈ پر شکر کے سیڑھے ہوں تو ٹرانسپلانت کے بعد بہت سفافی کے جو قدرتی عوامل ہوتے ہیں ان کا تیزی سے متاثر ہونا گردنے کی وجہ سے ممکن ہے۔

پر شکر کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔

## کذنی ٹرانسپلانتیشن کے دوران کیا ہوتا ہے؟

کذنی ٹرانسپلانتیشن میں محنت مندرجہ جسم میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے تمام موراخام دیتا ہے جو اس سے مغل کردنہ ناکارہ ہونے کے باعث نہیں دے پا رہا تھا۔

نیا گردنے کی پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں بابائیں لگایا جاتا ہے جہاں اسے قریبی خون کی روکی دوسرا سرجری میں لیے جاتا ہے۔ گرداہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ آسانی سے خون کی روکوں اور پیشاب کی تھیل سے جڑ کئے۔ آپ کے نئے گردنے کی نس اور شریان کا پکی کچھ دواؤں کے کیسا یہ ایفا کی جسکی تحریک ہو، پیٹ کے مل لئے رہنے سے بھی کوئی افیکشن ہو سکتا ہے، جب تک کہ آپ ٹرانسپلانت کے بعد دوائل رہے ہوں، آپ کے جسم کا نچلے حصہ افیکشن کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے۔

## آپ کا نیا گردنے کاہاں سے آئے گا؟

کذنی ٹرانسپلانتیشن کیلئے دوڑائیوں سے گردنے حاصل ہوتے ہیں، ایک گردنے کی طبیعہ کرنے والے زندہ افراد و دواؤم وہ جو سرجری وقت گردنے کے طبقہ کر گئے ہوں۔ اپنی زندگی میں گردنے کی طبیعہ کرنے والے زیادہ تر قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور بعض اوقات شریک حیات۔ دوسرا صورت وہ ہی ہے کہ مرتبے وقت کی نے ڈوز کارڈ پر تخطی کر کے اپنے گردنے کے طبیعہ کر دیے ہوں۔ مرحوم کے رونا بھی وصال کے وقت گردنے کے طبیعے کے جانے کی تصدیق اور جاہازت دیتے ہیں۔

اس بات کے لیکن کیلئے کہ آیا گردنے کی طبیعہ مذکورہ متوسط میں موزوں مطابقت رکھتا ہے، اور کسی منتقل ہوئے نالی بیماری کا شکار تو نہیں یا کوئی اور دشواریاں تو نہیں، تمام عطیہ کرنے والوں کا مکمل طبیعہ کاہاں کیا جاتا ہے۔

بعض مریضوں میں یہ عمل بندرنگ ہو سکتا ہے، ہر حال یہ نظرناک علامات کی تشویشاًک ابتداء ہے، تمام مریضوں کو تم اعلمات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں۔

کیونکہ خرابی کا سلسلہ بندرنگ ہوتا ہے اس لیے بعض مریض ان خطرناک علامات کا اس وقت تک احساس نہیں کرتے جب تک کو علاج سے وہ اپنے آپ کو بہتر جھوٹ نہ کرنے لگیں۔

گردنہ ناکارہ ہو جانے کی تشخیص کے بعد مریض مختلف طرح کے جذباتی رویوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے، اعتداد کا ختم ہو جانا، خوف محسوس کرنا، غصہ آنا اور بعض اوقات یہ تمام روئیے۔ اس وقت آپ کی محسوسات جس طرح کی بھی ہوں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان سے اپنی تمام محسوسات اور جذبات کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہ آپ کیلئے بہت مفید اور مددگار ثابت ہو گا۔

## گردنہ ناکارہ ہو جانے کی وجہات:

گردنہ ناکارہ ہو جانے کی بہت سی وجود ہات ہیں لیکن اب تک بہت سے لوگوں میں کوئی ایک ہی وجہ نہیں پائی گئی۔ عمومی وجود ہات میں ڈیاٹیس، ہالی بلڈ پر شکر اور گردنے پر بغیر تکلیف کی سوچن ہے جسے (کلیمیر یا لونا فرائیٹس) بھی کہا جاتا ہے۔ بیان ہیغہ وہی گردنے میں صفائی کے جو قدرتی عوامل ہوتے ہیں ان کا تیزی سے متاثر ہونا گردنے کی وجہ سے شامل ہے۔

دیگر عمومی وجود ہات میں موروثی طور پر گردنے کی سوچن (پولی سٹک کذنی ڈیزین) گردنے میں پچھری کامتوتر افیکشن اور پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ۔

## گردنہ ناکارہ ہو جانے کی علامات:

علامات میں سے بعض یہ ہیں:

- عموماً یہارہنے کی شکایت

- روزمرہ کی معمولات میں عدم دلچسپی، آرام یا ذہن کو مرکوز کرنے میں دشواری

- تحکماوات اور توقاتی کا خیار

- یادداشت میں کمی

- رات میں بار بار پیشاب آنا

- کھجوری

- ناگلوں کی سوچن

## گردنے ناکارہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟

کذنی ٹرانسپلانتیشن یعنی گردنے کی منتقل ایک ایسی سرجری ہے جس میں ایک شخص کا گردنے جو کمبل طور پر صحیح کام کر رہا ہو، ایسے دوسرے شخص کو منتقل کر دیا جاتا ہے جس کا گردنے کام کرنا چھوڑ جکا ہو۔

یہ سرجری ایسے مریض کو تجویز کی جاتی ہے پری پری ٹیو اسٹمٹ اور پری پریشن سے گذاریا گیا ہوا اس سرجری کے ذریعے مریض قدرے بہتر حالات میں ہو۔ ٹرانسپلانتیشن کے وقت ڈائیٹریٹھیڈول کے ذریعے مریض قدرے بہتر حالات میں ہو۔

ٹرانسپلانتیشن کے میں ایک بندرنگ کاہاں سے عطیہ کیا گیا ہوتا ہے (کاڈوار پریشن) یا پھر کسی اپنے یا غیرہ کاہاں سے عطیہ کیا گیا ہوتا ہے (لیوگر ٹرانسپلانتیشن)۔

اگر آپ کو مریض کی تشخیص حال ہی میں ہوئی ہے:

گردنہ ناکارہ ہو جانے کی تشخیص کے بعد مریض مختلف طرح کے جذباتی رویوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے، اعتداد کا ختم ہو جانا، خوف محسوس کرنا، غصہ آنا اور بعض اوقات یہ تمام روئیے۔ اس وقت آپ کی محسوسات جس طرح کی بھی ہوں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان سے اپنی تمام محسوسات اور جذبات کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہ آپ کیلئے بہت مفید اور مددگار ثابت ہو گا۔

## گردنہ ناکارہ ہو جانے کی وجہات:

گردنہ ناکارہ ہو جانے کی بہت سی وجود ہات ہیں لیکن اب تک بہت سے لوگوں میں کوئی ایک ہی وجہ نہیں پائی گئی۔ عمومی وجود ہات میں ڈیاٹیس، ہالی بلڈ پر شکر اور گردنے پر بغیر تکلیف کی سوچن ہے جسے (کلیمیر یا لونا فرائیٹس) بھی کہا جاتا ہے۔ بیان ہیغہ وہی گردنے میں صفائی کے جو قدرتی عوامل ہوتے ہیں ان کا تیزی سے متاثر ہونا گردنے کی وجہ سے شامل ہے۔

دیگر عمومی وجود ہات میں موروثی طور پر گردنے کی سوچن (پولی سٹک کذنی ڈیزین) گردنے میں پچھری کامتوتر افیکشن اور پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ۔

## کذنی ٹرانسپلانتیشن کے دوران کیا ہوتا ہے؟

کذنی ٹرانسپلانتیشن میں محنت مندرجہ جسم میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں وہ اپنے تمام موراخام دیتا ہے جو اس سے مغل کردنہ ناکارہ ہونے کے باعث نہیں دے پا رہا تھا۔

نیا گردنے کی پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں بابائیں لگایا جاتا ہے جہاں اسے قریبی خون کی روکی دوسرا سرجری میں لیے جاتا ہے۔ گرداہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ آسانی سے خون کی روکوں اور پیشاب کی تھیل سے جڑ کئے۔ آپ کے نئے گردنے کی نس اور شریان کا پکی کچھ دواؤں کے کیسا یہ ایفا کی جسکی تحریک ہو، پیٹ کے مل لئے رہنے سے بھی کوئی افیکشن ہو سکتا ہے، جب تک کہ آپ ٹرانسپلانت کے بعد دوائل رہے ہوں، آپ کے جسم کا نچلے حصہ افیکشن کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے۔

علمات میں سے بعض یہ ہیں:

- عوامیہارہنے کی شکایت

- روزمرہ کی معمولات میں عدم دلچسپی، آرام یا ذہن کو مرکوز کرنے میں دشواری

- تحکماوات اور توقاتی کا خیار

- یادداشت میں کمی

- رات میں بار بار پیشاب آنا

- کھجوری

- ناگلوں کی سوچن

## تعارف:

کذنی ٹرانسپلانتیشن یعنی گردنے کی منتقل ایک ایسی سرجری ہے جس میں ایک شخص کا گردنے جو کمبل

طور پر صحیح کام کر رہا ہو، ایسے دوسرے شخص کو منتقل کر دیا جاتا ہے جس کا گردنے کام کرنا چھوڑ جکا ہو۔

یہ سرجری ایسے مریض کو تجویز کی جاتی ہے پری پری ٹیو اسٹمٹ اور پری پریشن سے گذاریا گیا ہوا اس سرجری کے ذریعے مریض قدرے بہتر حالات میں ہو۔ ٹرانسپلانتیشن کے وقت ڈائیٹریٹھیڈول کے ذریعے مریض قدرے بہتر حالات میں ہو۔

ٹرانسپلانتیشن کے میں ایک بندرنگ کاہاں سے عطیہ کیا گیا ہوتا ہے (کاڈوار پریشن) یا پھر کسی اپنے یا غیرہ کاہاں سے عطیہ کیا گیا ہوتا ہے (لیوگر ٹرانسپلانتیشن)۔